

BRONCHOSTOP®

MAX 8u1

Sastojci prirodnog podrijetla:
Korijen sljeza, islandski lišaj i hijaluronska kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu za uporabu prije nego uzmete ovaj sirup protiv kašlja.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Bronchostop MAX 8u1 i za što se koristi?
2. Što Bronchostop MAX 8u1 sadrži?
3. Što morate znati prije nego uzmete Bronchostop MAX 8u1?
4. Kako uzimati Bronchostop MAX 8u1?
5. Kako čuvati Bronchostop MAX 8u1?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bronchostop MAX 8u1 i za što se koristi?

Ublažavanje svih vrsta kašlja povezanih s prehladom:

Bronchostop MAX 8u1 sirup namijenjen je za ublažavanje svih vrsta kašlja (suhog i produktivnog) povezanih s prehladom, kao i bolnog grla uzrokovanog prehladom, promuklosti, potrebe za pročišćavanjem grla, škakljanja u grlu, suhoće u ustima i grlu te otežanog gutanja.


Bronchostop MAX 8u1 : Jedan proizvod za ublažavanje osam simptoma povezanih s prehladom:

- Suhi kašalj
- Produktivni kašalj
- Bolno grlo
- Potreba za pročišćavanjem grla
- Škakljanje u grlu
- Promuklost
- Suhoća u ustima i grlu
- Otežano gutanje

Ekstrakt islandskog lišaja (Cetraria islandica) i korijena sljeza (Althaea officinalis) sadržani u Bronchostop MAX 8u1 sirupu djeluju poput umirujućeg balzama koji prekriva nadraženu sluznicu grla. Sluz stvara fizički zaštitni sloj koji sprječava prodor stranih čestica i štiti sluznicu. Time se brzo ublažava nadraženost grla te omogućuje oporavak sluznice. Hijaluronska kiselina i ksantanska guma pridonose vlaženju usta i grla, čime dodatno podupiru umirujuće djelovanje islandskog lišaja (Cetraria islandica) i korijena sljeza (Althaea officinalis). Kombinacija sastojaka također pridonosi duljem učinku ublažavanja kašlja.

Dodatno, Bronchostop MAX 8u1 pomaže u zaštiti sluznice usta i ždrijela od isušivanja. Bronchostop MAX 8u1 je sirup protiv kašlja koji uglavnom sadrži sastojke prirodnog podrijetla i i stoga je dobro podnošljiv. Bronchostop MAX 8u1 ne sadrži šećer i zato je siguran za zube. Dodatno, ne sadrži alkohol, laktozu, gluten, genetski modificirane organizme niti umjetna bojila.

Zaštitni sloj od korijena sljeza, islandskog lišaja, hijaluronske kiseline i ksantanske gume



2. Što Bronchostop MAX 8u1 sadrži?

15 ml Bronchostop MAX 8u1 sadrži:
168 mg ekstrakta korijena sljeza
324 mg suhog ekstrakta islandskog lišaja
25.8 mg natrijeva hijaluronata
60 mg ksantan gume

Ostali sastojci: metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, ksilitol, glicerol bezvodni, limunska kiselina monohidrat, aroma limuna i limete (sadrži limonen), saharin natrij, ulje eukaliptusa (sadrži cineol), pročišćena voda

3. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchostop MAX 8u1?

Nemojte uzimati Bronchostop MAX 8u1

Ako ste preosjetljivi ili alergični na islandski lišaj ili korijen sljeza, ili na bilo koji drugi sastojak ovog medicinskog proizvoda naveden u dijelu 2.

Bronchostop MAX 8u1 sadrži metil-4-hidroksibenzoat i propil-4-hidroksibenzoat kao konzervanse te ulje eukaliptusa. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene).

Ovaj medicinski proizvod sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) u 15 ml, što znači da je praktički "bez natrija".

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i ostali oblici interakcija

Istodobna primjena Bronchostop MAX 8u1 s drugim lijekovima: Ako uzimate druge lijekove, preporučuje se da ih uzimate ½ sata do 1 sat prije ili nakon uzimanja Bronchostop MAX 8u1.

Primjena u trudnoći i tijekom dojenja:

Primjena Bronchostop MAX 8u1 nije preporučena tijekom trudnoće i dojenja.

Molimo, obratite se liječniku ako:

- vaši simptomi potraju ili se pogoršaju nakon 5 dana.
- se tijekom primjene Bronchostop MAX 8u1 sirupa pojavi vrućica ili gnojni iskašljaj.

Primjena u bolesnika sa šećernom bolešću

15 ml Bronchostop MAX 8u1 sadrži 0,10 CU (jedinica ugljikohidrata).

Neželjeni štetni učinci

Bronchostop MAX 8u1 sirup sadrži metil-4-hidroksibenzoat i propil-4-hidroksibenzoat kao konzervanse, koji mogu uzrokovati (odgođene) alergijske reakcije.

Bronchostop MAX 8u1 sirup može uzrokovati probavne smetnje i reakcije preosjetljivosti.

4. Kako uzimati Bronchostop MAX 8u1?

Preporučena doza:

Adolescenti od 12 godina starosti i odrasli: 15 ml 3 puta dnevno
Djeca u dobi od 6 do 11 godina: 7,5 ml 3 puta dnevno
Djeca u dobi od 4 do 5 godina: 5 ml 3 puta dnevno

Bronchostop MAX 8u1 sirup preporučuje se za primjenu kod djece u dobi od 4 godine i starije.

Radi lakšeg doziranja, priložena je mjerna čašica.

Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

5. Kako čuvati Bronchostop MAX 8u1?



Ovaj proizvod ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.



Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nakon uporabe dobro zatvorite bocu. Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.



Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj medicinski proizvod čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Radi očuvanja okoliša, pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti medicinske proizvode koje više ne koristite. Ova će mjera pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
Kako Bronchostop MAX 8u1 izgleda?

Bronchostop MAX 8u1 je tekućina napunjena u smeđe staklene boce s originalno zatvorenim navojnim čepom. Dostupne veličine: do 120 ml, 200 ml i 240 ml. Nisu sve veličine pakiranja nužno dostupne na tržištu. Priložena mjerna čašica sa skalom između 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno doziranje proizvoda.



Bronchostop MAX 8u1
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, Njemačka

CE0482

Proizvodnja:
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Beč, Austrija



Distributer:
Oktal Pharma d.o.o.
Utinjska 40
10 020 Zagreb, Republika Hrvatska



Mjerna čaša:
Kunststoffwerk Kremsmünster
GmbH
Kremseggerstraße 17
4550 Kremsmünster, Austrija

CE0483



Broj serije nalazi se na naljepnici i kutiji.

Datum posljednje revizije: prosinac 2025.