

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bronchostop Trio oralna otopina

suhi ekstrakt korijena običnog bijelog sljeza, suhi ekstrakt cvijeta lipe,
suhi ekstrakt lista trputca

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana (3 dana u djece).

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Bronchostop Trio oralna otopina i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchostop Trio oralnu otopinu
3. Kako uzimati Bronchostop Trio oralnu otopinu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bronchostop Trio oralnu otopinu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bronchostop Trio oralna otopina i za što se koristi

Polisaharidi sadržani u korijenu običnog bijelog sljeza i listu trputca ublažavaju nadražaj usne šupljine ili ždrijela, a time i potrebu za kašljanjem tijekom dana, kao i tijekom noći. Sastojci cvijeta lipe potiču znojenje i tako ublažavaju vrućicu tijekom prehlade.

Tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje suhog kašlja kao i kašlja tijekom noći, nadražaja ždrijela i poticanja znojenja tijekom vrućice (niskog stupnja) kao i ranih simptoma obične prehlade.

Tradicionalni biljni lijek za primjenu kod naznačenih indikacija, isključivo temeljem dugotrajne uporabe

Bronchostop Trio oralna otopina je indicirana za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 4 godine.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana (3 dana u djece).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchostop Trio oralnu otopinu

Nemojte uzimati Bronchostop Trio oralnu otopinu

- ako ste alergični na korijen običnog bijelog sljeza, cvijet lipe ili list trputca ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Bronchostop Trio oralnu otopinu.

Ako se simptomi pogoršaju tijekom primjene lijeka ili ako se pojave otežano disanje, visoka temperatura ili gnojni iskašljaj, treba se obratiti liječniku.

Apsorpcija istodobno primijenjenih lijekova može se odgoditi. Kao mjera predostrožnosti, ovaj se lijek ne smije uzimati 30 minuta do 1 sat prije ili nakon uzimanja drugih lijekova.

Djeca

Primjena u djece mlađe od 4 godine nije utvrđena zbog nedostatka odgovarajućih podataka.

Drugi lijekovi i Bronchostop Trio oralna otopina

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primijenili ili biste mogli uzeti/primijeniti bilo koje druge lijekove.

Interakcije nisu poznate.

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost primjene tijekom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Primjena tijekom trudnoće i dojenja se ne preporučuje jer nije dostupno dovoljno podataka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bronchostop Trio oralna otopina sadrži ksilitol

Ovaj lijek sadrži 11,04 g ksilitola u maksimalnoj dnevnoj dozi (60 ml). Može imati laksativni učinak. Kalorijska vrijednost ksilitola je 2,4 kcal/g.

Bronchostop Trio oralna otopina sadrži metilparahidroksibeznoat i propilparahidroksibenzoat

Ovi konzervansi mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene).

Bronchostop Trio oralna otopina sadrži propilenglikol i benzilni alkohol

Ovaj lijek sadrži 13,6 mg propilenglikola i 0,002 mg benzilnog alkohola u jedinjoj dozi (15 ml). Benzilni alkohol može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Bronchostop Trio oralnu otopinu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasle osobe i adolescenti stariji od 12 godina:

15 ml (pomoću priložene mjerne čašice) do 4 puta na dan (sveukupna dnevna doza do 60 ml). Posljednju dozu treba uzeti neposredno prije odlaska na spavanje.

Djeca u dobi od 4 do 11 godina:

7,5 ml (pomoću priložene mjerne čašice) 3 do 4 puta na dan (sveukupna dnevna doza do 30 ml). Posljednju dozu treba uzeti neposredno prije odlaska na spavanje.

Način primjene

Kroz usta.

Bronchostop Trio oralna otopina se uzima nerazrijeđena. Preporučuje se izbjegavati piti i/ili jesti 30 minuta do 1 sat nakon uzimanja.

Priložena je mjerna čašica.

Trajanje primjene:

Ako se simptomi pogoršaju ili traju dulje od 5 dana (3 dana u djece) tijekom primjene lijeka, treba se obratiti liječniku.

Primjena u djece

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 4 godine jer ne postoji dovoljno podataka.

Ako uzmete više Bronchostop Trio oralne otopine nego što ste trebali

Nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Bronchostop Trio oralnu otopinu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave nisu poznate.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. **Kako čuvati Bronchostop Trio oralnu otopinu**

Nakon prvog otvaranja, ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Nakon uporabe čvrsto zatvorite spremnik. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici na boci iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon otvaranja, iskoristite unutar 2 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. **Sadržaj pakiranja i druge informacije**

Što Bronchostop Trio oralna otopina sadrži

Djelatne tvari su:

15 ml (= 16,3 g) oralne otopine sadrži:

- 187,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Althaea officinalis* L., radix (koriijen običnog bijelog sljeza) (7-9:1), ekstrakcijsko otapalo: voda.
- 136,4 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) *Tilia cordata* Miller, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia x vulgaris* Heyne ili njihove mješavine, flos (lipov cvijet) (3-8:1), ekstrakcijsko otapalo: voda.
- 150,0 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Plantago lanceolata* L., folium (trpučev list) (4-6:1), ekstrakcijsko otapalo: voda.

- Drugi sastojaci su:
maltodekstrin; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; glicerol; ksilitol (E 967); metilparahidroksibenzoat (E 218); propilparahidroksibenzoat (E 216); citratna kiselina hidrat (za prilagodbu pH); ksantanska guma; aroma jagode (sadrži benzilni alkohol (E 1519), propilenglikol (E 1520)); pročišćena voda.

Kako Bronchostop Trio oralna otopina izgleda i sadržaj pakiranja

Bronchostop Trio oralna otopina je smeđa, neprozirna oralna otopina. Puni se u smeđe staklene boce zatvorene s zatvaračem s navojem, pakiranja od 120 ml, 200 ml i 240 ml. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja. Priložena mjerna čašica sa skalom između 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno mjerenje preporučene količine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, 1160 Beč, Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Oktal Pharma d.o.o., Utinjska cesta 40, 10020 Zagreb
Tel.: 01/6595 777

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija:	BRONCHOSTOP Erkältungs- und Hustensaft
Bugarska:	Bronchostop Nite 187.5 mg / 136.4 mg / 150.0 mg oral solution
Češka:	Bronchostop Trio
Estonija:	Broncophen Nite
Hrvatska:	Bronchostop Trio oralna otopina
Mađarska:	Bronchostop Trio köhögés és megfázás elleni felsőleges oldat
Rumunjska:	Bronchostop Trio pentru Tuse și Răceală soluție orală
Slovenija:	Slez, trpotec in lipa Bronchostop peroralna raztopina
Slovačka:	Bronchostop deň a noc perorálny roztok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima. (120 ml, 200 ml)

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni. (240 ml)

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2025.