





5. Kako čuvati Bronchostop Kids?

 Ovaj proizvod se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

 Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite bocu. Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.

 Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj medicinski proizvod čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Radi očuvanja okoliša, pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti medicinske proizvode koje više ne koristite. Ova će mjera pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije


Kako Bronchostop Kids izgleda?

Bronchostop Kids je smeđa tekućina. Sastojci prirodnog podrijetla mogu dovesti do stvaranja finih čestica, a boja može varirati od svijetle do tamno smeđe. Te moguće varijacije ni nakoji način ne utječu na kvalitetu sirupa.

Smeđe staklene boce s originalno zabrtvljenim zatvaračem s navojem od 120 ml, 200 ml i 240 ml. U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja. Priložena mjerna čaša sa skalom između 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno doziranje preporučene količine.

Druge informacije

Proizvođač:

 HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, Njemačka


Proizvodnja:
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Beč, Austrija

Distributer:
Oktal Pharma d.o.o.
Utjinska 40
10 020 Zagreb, Republika Hrvatska

Broj serije nalazi se na naljepnici i kutiji.

CE 0482

Bronchostop Kids je robna marka tvrtke Kwizda Pharma
Datum posljednje revizije: siječanj, 2020.

14319_2_HR 
668


UPUTA ZA UPORABU

Informacije za korisnika

Bronchostop Kids 120 ml

Obični bijeli sljez i med

Poštovani,
odabравši Bronchostop Kids, odabrali ste pouzdan proizvod brzog djelovanja za Vas i Vašu obitelj, koji pomaže kod svakog kašlja povezanog s prehladom, bilo da se radi o suhom ili vlažnom (produktivnom) kašlju.

 Pažljivo pročitajte cijelu uputu za uporabu prije nego počnete uzimati ovaj sirup protiv kašlja.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Bronchostop Kids i za što se koristi?
2. Što Bronchostop Kids sadrži?
3. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchostop Kids?
4. Kako uzimati Bronchostop Kids?
5. Kako čuvati Bronchostop Kids?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bronchostop Kids i za što se koristi?

Obični bijeli sljez i med, vrijedni glavni sastojci u Bronchostop Kidsu, djeluju kao balzam koji prekriva i smiruje upaljenu sluznicu ždrijela. Sluz stvara fizički zaštitni sloj protiv stranih čestica i tako ublažava suhi, nadražajni kašalj te omogućuje oporavak sluznice.

Bronchostop Kids pouzdano i brzo ublažava svaki kašalj povezan s prehladom, bilo da se radi o suhom ili vlažnom (produktivnom) kašlju. Osim toga, Bronchostop Kids pomaže u zaštiti sluznice usta i ždrijela u slučaju suhoće. Također, za vokalnu higijenu tijekom govora i pjevanja sloj služi štiti sluznice i ublažava simptome poput kašlja, osjećaja škakljanja u grlu i potrebe pročišćavanja grla.

Bronchostop Kids je sirup protiv kašlja koji sadrži većinom prirodne sastojke, te ne sadrži alkohol.

Bronchostop Kids se vrlo dobro podnosi i stoga je prikladan za djecu.

Bronchostop Kids nije prikladan samo za primjenu tijekom dana, već je također idealan za primjenu tijekom noći. Svojim učinkom smirivanja pomaže miran i okrepljujući san.

Suhi kašalj - nadražajni kašalj

Suhi ili nadražajni kašalj obično je bez ikakve sluzi i može imati različite pokretače. Na početku ili na kraju ciklusa kašlja povezanog s prehladom moguća je nadraženost sluznica gornjih dišnih puteva. Suhi zrak, strane čestice poput prašine ili alergena te virusi i bakterije također mogu nadražiti sluznice.

Vlažni kašalj - produktivni kašalj

Sluzni sloj tijela, koji održava bronhe vlažnim i štiti ih od isušivanja, ima nekoliko



Pharmacode 668





sastojaka, primjerice mrtve stanice, razne bjelančevine i bijele krvne stanice. U slučaju bolesti dišnih puteva, mogu mu se promijeniti sastav kao i boja i gustoća. Ako je stvaranje sluzi povećano, tijelo iz razgranate mreže bronha kašljanjem pokušava izbaciti njen višak. Sluz se iskašljava u usnu šupljinu, gdje se proguta ili ispljune.

Također, kod vlažnog kašlja, kad je sluznica ždrijela nadražena, Bronchostop Kids pomaže smiriti nadraženost.


Pouzdanu ublažavanje kašlja

Refleks kašlja bitan je za pročišćavanje dišnih puteva. Pokreće se kad su prisutne izlučevine koje je potrebno iskašljati. Kod ovog takozvanog produktivnog kašlja nakupljena sluz uzrokuje kašljanje. Strane čestice također mogu aktivirati receptore kašlja i pokrenuti refleks kašlja („suhi kašalj“).

Bronchostop Kids smiruje refleks kašlja u fazama suhog i produktivnog vlažnog kašlja tako što receptore kašlja prekriva zaštitnim slojem.



Zaštitni sloj korijena
običnog bijelog sljeza
i meda



Aktivirani receptor
kašlja

2. Što Bronchostop Kids sadrži?

15 ml Bronchostop Kidsa sadrži:

143 mg suhog ekstrakta korijena običnog bijelog sljeza
750 mg meda

Drugi sastojci su: ksilitol; ksantanska guma; glicerol, bezvodni; citratna kiselina, aroma jagode; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; voda, pročišćena. Bronchostop Kids ne sadrži umjetne boje, laktozu, gluten, alkohol ni genetski modificirane organizme.

3. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchostop Kids?

Nemojte uzimati Bronchostop Kids

ako ste alergični na obični bijeli sljez ili med ili na neki drugi sastojak ovog medicinskog proizvoda naveden u dijelu 2. U slučaju alergijske reakcije, molimo prestanite uzimati ovaj proizvod i obratite se liječniku.

15 ml Bronchostop Kidsa sadrži 2,76 g ksilitola. Kalorijska vrijednost ksilitola je 2,4 kcal/g. Ksilitol može imati laksativni učinak.

Upozorenja i mjere opreza

Primjena u bolesnika koji ne podnose neke šećere

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi smjeli uzimati ovaj proizvod jer sadrži med.

Primjena u bolesnika sa šećernom bolešću

15 ml Bronchostop Kidsa sadrži 0,3 jedinice ugljikohidrata.

Trudnoća i dojenje

Bronchostop Kids se ne preporučuje tijekom trudnoće i dojenja.

Djeca:

Za djecu mlađu od 3 godine potrebno je obratiti se liječniku kako bi isključili prisutnost ozbiljnijih bolesti. Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 1 godine.

Istodobno uzimanje Bronchostop Kidsa s drugim lijekovima

Ako uzimate druge lijekove, savjetuje se uzimati ih 1/2 sata do 1 sat prije ili poslije uzimanja Bronchostop Kidsa.

Molimo, obratite se liječniku ako:

- Vaši simptomi potraju ili se pogoršaju nakon 5 dana
- se tijekom uzimanja Bronchostop Kidsa pojavi otežano disanje, vrućica ili gnojni iscjedak.

Bronchostop Kids sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije (mogu se pojaviti kao odgođene reakcije).

4. Kako uzimati Bronchostop Kids?

Radi lakšeg doziranja, priložena je mjerna čaša.

Djeca u dobi od 6 do 11 godina: 15 ml do 4 puta na dan

Djeca u dobi od 4 do 5 godina: 7,5 ml do 4 puta na dan

Djeca u dobi od 2 do 3 godine: 5 ml do 4 puta na dan

Djeca od navršene 1 godine: 5 ml do 3 puta na dan

Bronchostop Kids se može uzimati tijekom dana i noći.

Za najbolje terapijske rezultate preporučuje se uzimati Bronchostop Kids onoliko često koliko je preporučeno.

Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.



Pharmacode 668

